

INDICACIONES

COPROPARASITOLÓGICO Y TEST DE GRAHAM

TEST DE GRAHAM (Escobillado)

- Se debe pasar una gasa (pequeña) por la zona marginal del ano en la mañana al despertar, sin previa higiene.
- Colocar la gasita en un frasco con solución formolada.
- Realizar esto por un periodo de 7 días seguidos. Usar una gasita diferente cada día e ir las colocando en el mismo frasco.
- Evitar el uso de talcos y aceites en la zona perianal durante los días de recolección.

COPROPARASITOLOGICO

- Recolectar una pequeña cantidad de materia fecal (del tamaño de una nuez) de todas las deposiciones espontáneas durante 7 días, en un periodo no mayor a 15 días.
- Si en un determinado día se recolectan dos o más deposiciones se considera sólo un día de recolección.
- Evitar contaminaciones con orina y contacto con el agua del inodoro.
- Colocar las muestras en un frasco con soluciones formolizadas.
- Evitar el uso de purgantes.

Por favor, cumpla con estas instrucciones.
Nuestro objetivo es LA CALIDAD y
depende también de Usted.

Ante cualquier duda consulte al Laboratorio.

Mater Dei- BioLab:

Gral. Paz 24 Este - Ciudad de San Juan

WhatsApp Secretaría: 264 5633551

WhatsApp Laboratorio: 264 5474233

Email: preanaliticabiolabsanjuan@gmail.com